

Písomná informácia pre používateľa

Xyrem 500 mg/ml perorálny roztok nátriumoxybát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Xyrem a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xyrem
3. Ako užívať Xyrem
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Xyrem
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Xyrem a na čo sa používa

Xyrem obsahuje liečivo nátriumoxybát. Xyrem pôsobí tak, že upevňuje nočný spánok, hoci presný mechanizmus účinku nie je známy.

Xyrem sa používa na liečbu narkolepsie s kataplexiou u dospelých, dospevajúcich a detí vo veku od 7 rokov.

Narkolepsia je porucha spánku, ktorá môže zahŕňať záchvaty spánku počas normálnych hodín bdenia, ako aj kataplexiu, spánkovú obrnu, halucinácie a zlý spánok. Kataplexia je nástup náhlej svalovej slabosti alebo obrny bez straty vedomia, ako odpoved' na náhlu emočnú reakciu, akou je zlost', strach, šťastie, smiech alebo prekvapenie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xyrem

Neužívajte Xyrem

- ak ste alergický na nátriumoxybát alebo na ktorukoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak máte nedostatok sukcinátsemialdehydhydrogenázy (vzácna metabolická porucha);
- ak máte veľkú depresívnu poruchu;
- ak sa liečite opioidom alebo barbiturátmi.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Xyrem, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte dýchacie alebo plúcne ťažkosti (a obzvlášť ak ste obézny), pretože Xyrem môže vyvoláť ťažkosti s dýchaním;
- ak máte alebo ste v minulosti mali depresívne ochorenie, myšlienky na samovraždu, úzkosti, psychózu (duševná porucha, ku ktorej môžu patrīť halucinácie, nesúvislý rečový prejav alebo chaotické a nepokojné správanie) alebo bipolárnu poruchu;

- ak máte srdcové zlyhanie, hypertenziu (vysoký krvný tlak), tŕažkosti s pečeňou alebo obličkami, môže byť potrebné upraviť dávku;
- ak ste v minulosti zneužívali lieky;
- ak máte epilepsiu, pretože užívanie Xyremu sa za týchto okolností neodporúča;
- ak máte porfýriu (menej častá metabolická porucha).

Ak sa vás čokoľvek z tohto týka, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Xyrem.

Ak sa u vás počas užívania Xyremu objaví pomočovanie a inkontinencia (neudržíte moč alebo stolicu), zmätenosť, halucinácie, epizódy námesačnosti alebo abnormálne myšenie, povedzte to ihned svojmu lekárovi. Hoci sú tieto účinky menej časté, keď sa vyskytnú, sú zvyčajne miernej až stredne tŕažkej povahy.

Ak ste vo vyšom veku, váš lekár bude starostlivo sledovať váš stav, aby preveril, či má Xyrem požadované účinky.

Xyrem má dobre známy potenciál pre zneužívanie. Po nepovolenom užívaní nátriumoxybátu sa zaznamenali prípady závislosti.

Váš lekár sa vás bude pýtať, či ste niekedy pred začiatkom liečby alebo počas užívania tohto lieku zneužívali lieky.

Deti a dospievajúci

Xyrem môžu užívať dospievajúci a deti vo veku od 7 rokov s telesnou hmotnosťou viac ako 15 kg.

Xyrem nemôžu užívať deti vo veku menej ako 7 rokov alebo s telesnou hmotnosťou menej ako 15 kg.

Ak si dieťa alebo dospievajúci, tvoj lekár ti bude pravidelne sledovať telesnú hmotnosť.

Počas upravovania dávky lekárom, čo môže trvať niekoľko týždňov, má rodič/opatrovateľ dôkladne sledovať dýchanie u dieťaťa počas prvých 2 hodín po užíti nátriumoxybátu aby posúdil, či sa nevyskytuje akákoľvek abnormalita dýchania, napríklad zastavenie dýchania na krátke časy počas spánku, počutelné dýchanie a modrásté sfarbenie pier a tváre. Ak sa zistí abnormalita dýchania, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc a čo najskôr o tom informovať lekára. Ak sa po prvej dávke zistí akákoľvek abnormalita, druhá dávka sa nesmie podať. Ak sa nezistí žiadna abnormalita, môže sa podať druhá dávka. Druhá dávka sa má podať najskôr po uplynutí 2,5 hodín od užitia prvej dávky a najneskôr do 4 hodín od užitia prvej dávky.

Ak ste mali alebo máte znepokojivé pocity, najmä ak sa cítite veľmi smutne alebo ste stratili chuť žiť, je dôležité, aby ste to povedali lekárovi alebo opatrovateľovi.

Iné lieky a Xyrem

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Xyrem sa nemá užívať predovšetkým spolu s liekmi, ktoré navodzujú spánok a s liekmi, ktoré znižujú činnosť centrálneho nervového systému (centrálny nervový systém je časť tela súvisiaca s mozgom a miechou).

Taktiež oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich typov liekov:

- lieky, ktoré zvyšujú činnosť centrálneho nervového systému
- antidepresíva
- lieky, ktoré môže telo spracovávať rovnakým spôsobom (napr. valproát, fenytoín alebo ethosuximid, ktoré sa používajú na liečbu záchvatov)
- topiramát (používaný na liečbu epilepsie)

Ak užívate valproát, vašu dennú dávku Xyremu bude potrebné upraviť (pozri časť 3), pretože to môže viesť k interakciám s valproátom.

Xyrem a alkohol

Pri užívaní Xyremu nesmiete požívať alkohol, pretože jeho účinky sa môžu zvýšiť.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Veľmi malý počet žien užíval Xyrem niekedy počas tehotenstva a niekoľko z nich spontánne potratilo. Riziko užívania Xyremu počas tehotenstva nie je známe, preto sa používanie Xyremu u tehotných žien alebo žien, ktoré sa pokúšajú otehotniť, neodporúča.

Pacientky užívajúce Xyrem nemajú dojčiť, pretože je známe, že Xyrem prechádza do materského mlieka. U dojčených detí matiek vystavených účinku lieku sa pozorovali zmeny v spánkovom režime.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Xyrem bude ovplyvňovať vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať nástroje alebo stroje. Najmenej 6 hodín po užíti Xyremu neved'te vozidlá, neobsluhujte t'ažké stroje ani nevykonávajte žiadne činnosti, ktoré sú nebezpečné alebo si vyžadujú duševnú ostrážitosť. Ked' prvýkrát začíname užívať Xyrem a ešte neviete, či na nasledujúci deň nebudeť ospalý, bud'te zvlášť opatrný pri vedení vozidiel, obsluhe t'ažkých strojov či vykonávaní akejkoľvek inej činnosti, ktorá môže byť nebezpečná alebo si vyžaduje plnú duševnú ostrážitosť.

Lekárom, rodičom alebo opatrovateľom sa odporúča, aby v prípade pediatrických pacientov čakali na vykonávanie činností, ktoré si vyžadujú duševnú bdelosť, motorickú koordináciu, alebo akýchkoľvek činností, ktoré môžu predstavovať fyzické riziko, aj dlhšie ako 6 hodín, v závislosti od individuálnej citlivosti.

Xyrem obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 182,24 mg sodíka (hlavnej zložky kuchynskej soli) v každom grame. To sa rovná 9,11 % odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelých.

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak potrebujete 2 g alebo viac nátriumoxybátu (Xyremu) denne počas predĺženého obdobia, zvlášť ak vám bola odporúčaná diéta s nízkym obsahom soli (sodíka).

3. Ako užívať Xyrem

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Je dôležité, aby ste na prípravu dávok Xyremu použili iba tú injekčnú striekačku, ktorá je súčasťou balenia. Injekčná striekačka ku Xyremu má dve rozdielne stupnice merania. Jedna stupnica sa vám môže hodit viac než tá druhá, v závislosti od toho, ktorú dávku vám predpísal lekár. Ked' si prezriete obidve stupnice, zistíte na ktorej je uvedená presná značka pre vašu dávku.

Dospelí – svojpomocne užívajúci Xyrem

- U dospelých je odporúčaná začiatočná dávka 4,5 g/každý deň podávaná v dvoch samostatných dávkach po 2,25 g.
- Váš lekár môže postupne zvyšovať vašu dávku až na maximálne 9 g/ každý deň podávaných v dvoch samostatných dávkach po 4,5 g.
- Užívajte Xyrem perorálne (cez ústa) dvakrát každú noc:
 - Prvú dávku užite pred spaním a druhú dávku o 2½ až 4 hodiny neskôr. Možno si budete musieť nastaviť budík, aby ste mali istotu, že sa zbudíte na užitie druhej dávky.

- Jedlo znižuje množstvo Xyremu, ktoré sa vstrebe do vášho organizmu. Preto je najlepšie užiť Xyrem v stanovených časoch 2 - 3 hodiny po jedle.
- Obe dávky si pripravte pred spaním.
- Užite dávky v priebehu 24 hodín od prípravy.

Dospievajúci a deti vo veku od 7 rokov s telesnou hmotnosťou najmenej 15 kg – svojpomocne užívajúci Xyrem

Pacientom vo veku od 7 rokov s telesnou hmotnosťou najmenej 15 kg správnu dávku vypočíta lekár na základe telesnej hmotnosti.

Váš lekár vám vypočíta správnu dávku. Neprekračujte dávku, ktorá vám bola predpísaná.

Dospelí – užívajúci Xyrem s valproátom

Ak užívate valproát spolu s Xyremom, váš lekár vám upraví dávku Xyremu.

- Ak sa užíva Xyrem spolu s valproátom, odporúčaná začiatočná dávka Xyremu u dospelých je 3,6 g/každý deň podávaná v dvoch samostatných dávkach po 1,8 g.
- Prvá dávka sa užíva pred spaním a druhá dávka o 2½ až 4 hodiny neskôr.

Dospievajúci a deti vo veku od 7 rokov s telesnou hmotnosťou najmenej 15 kg – užívajúci Xyrem s valproátom

Ak užívate valproát spolu so Xyremom, dávku Xyremu vám upraví váš lekár.

Ťažkosti s obličkami alebo pečeňou

- Ak máte problémy s obličkami, zvážte stravovacie odporúčania na zníženie príjmu sodíka (soli).
- Ak máte problémy s pečeňou, začiatočná dávka sa má znížiť na polovicu. Váš lekár vám môže dávku postupne zvýšiť.


Pokyny na riedenie Xyremu

Nasledovné pokyny vysvetľujú, ako pripraviť Xyrem. Pozorne si prečítajte tieto pokyny a postupujte podľa nich krok za krokom. Xyrem nesmú pripravovať deti.

Papierová škatuľka Xyremu obsahuje 1 fl'ašu lieku a ako pomôcku odmernú striekačku (s dvomi rôznymi odmernými stupnicami) a dva dávkovacie poháre s detskými bezpečnostnými viečkami.

1. krok

- Odstráňte viečko fl'aše zatlačením nadol a súčasným otáčaním viečka proti smeru hodinových ručičiek (doľava).
- Po odstránení viečka postavte fl'ašu kolmo na dosku stola.
- Na vrchu fl'ašky je tesnenie z krycej fólie z plastickej hmoty, ktoré sa musí pred prvým použitím fl'ašky odstrániť.
- Fl'ašu držte v kolmej polohe a zasuňte tlakový adaptér fl'aše do hrdla fl'aše. Je to potrebné urobiť len po prvom otvorení fl'aše. Adaptér možno potom ponechať vo fl'aši na všetky následné použitia.




2. krok

- Ďalej zasuňte hrot odmernej striekačky do stredu otvoru fláše a pevne zatlačte nadol.
- Jednou rukou držte flášu a striekačku, druhou rukou natiahnite predpísanú dávku vyťahovaním piestu. POZNÁMKA: Liek nepotečie do striekačky, ak nebude držať flášu rovno v kolmej polohe.




3. krok

- Vytiahnite striekačku zo stredu otvoru fláše.
- Stlačením piestu vyprázdnite liek zo striekačky do jedného z priložených dávkovacích pohárov. Zopakujte tento krok s druhým dávkovacím pohárom.
- Potom pridajte do každého dávkovacieho pohára asi 60 ml vody (60 ml sú asi 4 polievkové lyžice).



4. krok

- Založte viečka na dávkovacie poháre a každé viečko otočte v smere hodinových ručičiek (doprava), až kým neklikne a uzáver sa neuzamkne do polohy bezpečnej pred deťmi (Upozornenie: keďže je viečko dávkovacieho pohára otočné, pohár je pred deťmi bezpečne uzavretý až po počutelnom kliknutí).
- Striekačku vypláchnite vodou.



- Tesne pred spaním:
 - Dospelí pacienti si dajú druhú dávku k posteli.
 - Rodič alebo opatrovateľ dospievajúcich a detí vo veku od 7 rokov nemá nechať druhú dávku pri posteli dieťaťa ani v dosahu dieťaťa.
 - Možno si budete musieť nastaviť budík, aby ste sa zobudili na druhú dávku, najskôr o 2½ hodiny a najneskôr 4 hodiny po vašej prvej dávke.

Potom:

- Odstráňte viečko z prvého dávkovacieho pohára zatlačením na uzamykateľné viečko bezpečné pred deťmi a otáčajte viečkom proti smeru hodinových ručičiek (doľava).
- Posediačky na posteli vypíte celú prvú dávku, viečkom znova zavorte pohár a ihneď si ľahnite. Deťom, ktoré spia dlhšie ako 8 hodín, ale menej ako 12 hodín, sa prvá dávka môže podať po 1 až 2 hodinách spánku u dieťaťa.
- Keď sa zbudíte alebo zbudíte dieťa o 2½ až 4 hodiny, odstráňte viečko z druhého dávkovacieho pohára. Posediačky na posteli vypíte celú druhú dávku bezprostredne predtým ako si ľahnete a budete pokračovať v spánku. Znova zavorte viečko na druhom pohári.

Ak máte pocit, že účinok Xyremu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac Xyremu, ako máte

K príznakom predávkovania Xyremom môže patríť nepokoj, zmätenosť, porucha pohybovej funkcie, porucha dýchania, rozmazané videnie, nadmerné potenie, bolesť hlavy, vracanie, znížené vedomie vedúce ku kóme a záchvatom, nadmerný smäd, svalové kŕče a slabosť. Ak užijete viac Xyremu, ako vám predpísali, alebo ho užijete omylom, okamžite vyhľadajte lekársku pohotovostnú službu. Zoberte si so sebou označenú flăšu s liekom, aj keď je prázdna.

Ak zabudnete užiť Xyrem

Ak ste zabudli užiť prvú dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete a potom pokračujte ako predtým. Ak zabudnete na druhú dávku, vyniechajte túto dávku a neužívajte Xyrem opäť až do ďalšieho večera. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vyniechanú dávku.

Ak si nie ste istý/á, či ste užili Xyrem

Ak máte pochybnosti o podaní dávky, dávku znova nepodávajte, aby sa znížilo riziko predávkovania.

Ak prestanete užívať Xyrem

Xyrem máte užívať tak dlho, ako vám povedal váš lekár. Ak prerušíte užívanie vášho lieku, môžete zistíť, že sa záchvaty kataplexie vracajú a môže sa vyskytnúť nespavosť, bolesť hlavy, úzkosť, závrat, ťažkosti so spánkom, ospalosť, halucinácie a abnormálne myslenie.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak prerušíte užívanie Xyremu na viac ako 14 po sebe nasledujúcich dní, poraďte sa so svojím lekárom, pretože by ste mali znova začať užívať Xyrem v zníženej dávke.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zvyčajne sú mierne až stredne závažné.

Dospelí – najčastejšie vedľajšie účinky pozorované v klinických štúdiách (vyskytujúce sa u 10 až 20 % pacientov):

- závraty
- nevoľnosť
- bolesť hlavy.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, **ihned' to povedzte svojmu lekárovi**.

Deti a dospievajúci – najčastejšie vedľajšie účinky pozorované v klinických štúdiách:

- pomocovanie sa v noci (18,3 %)
- nevoľnosť (12,5 %)
- vracanie (8,7 %)
- úbytok telesnej hmotnosti (8,7 %)
- znížená chut' na jedlo (6,7 %)
- bolesť hlavy (5,8 %)
- závrat (5,8 %)
- rozmýšľanie o samovražde (1 %)
- duševné ťažkosti (strata kontaktu s realitou) (1 %)

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, **ihned' to povedzte svojmu lekárovi**

Vedľajšie účinky u dospelých a detí sú rovnaké. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, ihned' to povedzte svojmu lekárovi:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

- nevoľnosť
- závrat
- bolest hlavy

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- ťažkosti so spánkom vrátane nespavosti, abnormálne sny, spánková obrna, ospanlivosť, nočné mory, námesačnosť, pomočovanie sa v noci, nadmerná spavosť počas dňa, ťažkosti so zaspávaním v priebehu noci
- pocit opitosti, tras, zmätenosť/dezorientácia, nejasné videnie, poruchy rovnováhy, pád, pocit „točenia sa“ (vertigo),
- pocit búšenia srdca, zvýšený krvný tlak, dýchavičnosť
- vracanie, bolesti žalúdka, hnačka
- anorexia, znížená chut' na jedlo, úbytok telesnej hmotnosti
- slabosť, únava, útlm
- potenie sa
- depresia
- svalové kŕče, opuch
- bolest kĺbov, bolest chrba
- porucha pozornosti, porucha citlivosti najmä na dotyky, abnormálne pocity pri dotyku, nezvyčajná chut'
- úzkosť, nervozita
- neudržanie moču
- chrápanie, upchatie nosa
- vyrážka
- zápal dutín, zápal nosa a hrdla

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- psychóza (duševná porucha, ku ktorej môžu patriť halucinácie, nesúvislý rečový prejav alebo chaotické a rozrušené správanie)
- paranoja, abnormálne myslenie, halucinácia, nepokoj, pokus o samovraždu
- ťažkosti so zaspávaním, syndróm nepokojných nôh
- zábudlivosť
- myoklónia (mimovoľné svalové kŕče)
- mimovoľný únik stolice
- precitlivenosť

Neznáme (časťosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- kŕč
- plytšie alebo pomalšie dýchanie, krátke prerušenie dýchania počas spánku
- žihľavka
- myšlienky na samovraždu, blud, rozmýšľanie o spáchaní násilia (vrátane ubližovania iným)
- podráždenosť, agresivita
- euforická nálada
- záchvat paniky
- mánia/bipolárna porucha
- sucho v ústach, dehydratácia
- opuch tváre (angioedém)
- bruxizmus (škrípanie zubov a zatínanie sánky)
- časté nutkanie na močenie/nutkanie na močenie (zvýšená potreba močiť)
- hučanie v ušiach (zvuky v ušiach ako sú zvonenie alebo šelest)
- poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom
- zvýšená chut' na jedlo
- strata vedomia
- dyskinéza (napr. abnormálne nekontrolované pohyby končatín)

- lupiny
- zvýšená sexuálna túžba
- noktúria (nadmerné močenie v noci),
- pocit dusenia

Ak sa u vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených vedľajších účinkov, **ihned to povedzte svojmu lekárovi.**

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na

Štátny ústav pre kontrolu liečiv,

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie,

Kvetná ul. 11,

SK-825 08 Bratislava 26,

Tel: + 421 2 507 01 206,

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducích účinkoch.

Formulár na elektronické podávanie hlásení:

<https://portal.sukl.sk/eskadra/>

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Xyrem

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na flăške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po nariedení v dávkovacích pohároch sa liek má použiť do 24 hodín.

Všetok obsah, ktorý ste nepoužili 90 dní po prvom otvorení flăše Xyremu, sa má zlikvidovať.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Xyrem obsahuje

- Liečivo je nátriumoxybát. Každý ml roztoku obsahuje 500 mg nátriumoxybátu.
- Ďalšie zložky sú čistená voda, kyselina jablčná a hydroxid sodný.

Ako vyzerá Xyrem a obsah balenia

Xyrem sa dodáva ako perorálny roztok v plastovej flăashi jantárovej farby s objemom 240 ml, ktorá obsahuje 180 ml roztoku a je uzavorená detským bezpečnostným uzáverom. Flăša je dodávaná s tesnením z krycej fólie z plastickej hmoty, ktoré je na vrchu flăše pod uzáverom. Každé balenie obsahuje jednu flăšu, tlakový adaptér flăše (PIBA), plastovú odmernú striekačku a dva dávkovacie poháre s detským bezpečnostným uzáverom.

Xyrem je číry až ľahko opalizujúci roztok.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgicko

Výrobca

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine l'Alleud, Belgicko

Od svojho lekára by ste mali dostať informačný balíček, ktorý obsahuje brožúru o tom, ako užívať tento liek, Často kladené otázky - informačný leták pre pacienta a kartičku s upozornením pre pacienta. Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 10/2022.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky:
<http://www.ema.europa.eu/>